

Umgang/Desinfektion bei Transport von SARS Cov-2-positiven Patienten

Situation 1:

Pat. nachweislich SARS-Cov-2-positiv **OHNE aerosolbildende** Symptome oder **Ausscheidungen**

Voraussetzung:

Pat trägt im Fahrzeug **dauerhaft und dicht anliegend** FFP2-Maske (falls nicht - s. Situation 2)

FFP2-Maske muss schon VOR Betreten des Fzg. getragen werden!

-> **Nach Transport: Desinfektion der patientennahen- und Touchflächen ausreichend**

Situation 2:

Pat. nachweislich SARS-Cov-2-positiv **MIT aerosolbildenden** Symptomen oder **Ausscheidungen**

ODER toleriert bei Situation 1 FFP2-Maske nicht

ODER entfernt diese bei Situation 1 während Transport (auch nur vorübergehend)

- > **Nach Transport: Komplette Fahrzeug-Desi nach Plan und wie bisher üblich**
- > Desinfektionsauftrag mit Auftragsnr. von Leitstelle (ist mit M. Fischer vom DRK so besprochen und von diesem der Leitstelle kommuniziert)

Symptome können sein:

- **Dyspnoe Husten/Niesen (Cave: AEROSOLBILDUNG!)**
- **Halsschmerzen/Schluckbeschwerden**
- **Fieber über 38°C**
- **Gastrointestinale Beschwerden: Durchfall, Übelkeit/Erbrechen, ggf. Bauchschmerzen - v.a. bei Kindern (Cave: AUSSCHIEDUNGEN!)**
- **Abgeschlagenheit/Gliederschmerzen/Inappetenz**
- **Geruchs-/Geschmacksverlust**

Es müssen **nicht zwingend alle** Symptome vorhanden sein!

17.8.2022

U. Baidner
Desinfektor

